



GESTIÓN DE LA CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA PATOLOGÍA ATENDIDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL (1996-2005)

V. Fuentes Leonarte; J.M. TeníaS Burillo; E. Navalón Ramón; S. Cogollos Carlins; A. Sarrión Bono. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DE LA FE. VALENCIA. VALENCIA

OBJETIVOS. Estimar la tendencia y estacionalidad de la demanda sanitaria global y por patologías según su gravedad y justificación en el Servicio de Urgencias de un hospital comarcal para el período 1996-2005.

DISEÑO. Estudio descriptivo de la incidencia de las visitas a Urgencias.

Ámbito de estudio. Un Departamento de Salud, empleando el servicio de Urgencias de un hospital comarcal como unidad de análisis.

SUJETOS. Todos los pacientes atendidos.

MEDICIONES. Reconocimiento mediante sinonimia de patologías banales: dolor de muelas, estreñimiento, amigdalitis no complicada, gastroenteritis no complicada e infección del trato urinario no complicada; y graves: reagudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ataque de asma, enfermedad cerebrovascular y patología cardíaca aguda.

RESULTADOS. Se atendieron 212927 urgencias, con un incremento medio anual del 4,8%. La demanda fue mayor en el periodo de mayo a julio.

Las patologías banales presentaron globalmente un incremento medio anual del 12,4% y las más graves del 1,6%. Las patologías banales presenta-

ron mayores incidencias en los meses cálidos (junio a agosto) y las más graves en la época más fría del año (octubre a abril).

Para el asma se identificaron dos picos de incidencia en marzo y mayo.

CONCLUSIONES

- 1) Los diez últimos años la demanda sanitaria urgente se ha incrementado cerca de un 5% anual.
- 2) Las patologías graves y justificadas se sitúan en tendencia por debajo de la evolución global.
- 3) Las patologías banales duplican, y en algunos casos triplican la tendencia media de toda la serie.
- 4) Este estudio apoya la hipótesis de un incremento de las urgencias hospitalarias debido a patologías banales, las cuales podrían haber sido atendidas en otro nivel asistencial como es Atención Primaria.