



TUBERCULOSIS EN POBLACION INMIGRANTE RESIDENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE DALUD 21 Y 22 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2006.

P. Montesinos Butron; R. Marco Aledo; E. Noguera Jiménez; J.G. Cano Montoro

OBJETIVOS: Describir y comparar las características epidemiológicas y clínicas de los casos de tuberculosis autóctonos (inmigrantes y españoles) entre 2004-2006, en los departamentos de salud 21/22 de la Comunidad Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO. Estudio descriptivo de las características clínicas y epidemiológicas de los casos de tuberculosis confirmados por microbiología.

AMBITO DE ESTUDIO. Departamentos de salud 21 y 22 de la Comunidad Valenciana.

SUJETOS. Población residente en ambos departamentos, inmigrantes y españoles.

MEDICIONES O INTERVENCIONES. Tasas de incidencia según número total de casos, año, sexo.

Los datos cuantitativos se expresan en forma de media y desviación estándar, se comparan por la t de student.

Los datos cualitativos se expresan en frecuencias y porcentajes para ambos grupos, la comparación con tablas 2x2 mediante χ^2 .

RESULTADOS: Se analizaron 127 casos de tuberculosis (55 inmigrantes), la incidencia global en ambos departamentos, es 14,08/100.000 habitantes en 2004, en 2005 15,47/100000 habitantes,

sin apenas diferencias hasta el año 2006 con 12,29/100.000 habitantes.

Las tasas globales de incidencia en hombres (19,57/100000 habitantes en 2004, 24,37/100000 habitantes en 2005, 17,99/100000 habitantes en 2006), mayores que en mujeres (8,3/100000 habitantes en 2004, 6,18/100000 habitantes en 2005, 6,3/100000 habitantes en 2006), igual ocurre en residentes españoles e inmigrantes.

La media de edad en inmigrantes es 32,24 años (DE 9,95) y en españoles 43,67 años (DE 21,35).

En ambos grupos la principal localización es pulmonar (89,1% inmigrantes y 84,7% españoles).

Dentro de los factores de riesgo el 58,2% de los extranjeros son inmigrantes <5 años.

Isoniazida (6,9%) es el fármaco con más resistencia en españoles, estreptomycin (5,5%), en inmigrantes.

Se realizaron estudios de contactos, un 67,3% de los casos inmigrantes y un 80,6% de casos españoles.

CONCLUSIONES: La incidencia de tuberculosis en población española se mantiene entre los años 2004 y 2006, en población extranjera disminuye en el año 2006.